

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 27-12-84457950

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE-ARDENNE

(ARDENNES, AUBE, MARNE, HAUTE-MARNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

62, Avenue Nationale, La Neuville, B.P. 1154, 51056 Reims Cedex, Tél. 09.06.43

ABONNEMENT ANNUEL

ÉDITION A ou B : 125 F

ÉDITION A + B : 225 F

BULLETIN N° 2 du 13 décembre 1984

ÉDITION GRANDES CULTURES

JAUNISSE NANISANTE : les pucerons sont toujours présents

CHARANÇON DU BOURGEON TERMINAL : Infestations sérieuses

CEREALES - JAUNISSE NANISANTE

Le temps exceptionnellement doux permet le maintien des pucerons dans les parcelles et des vols faibles sont toujours enregistrés à la tour de piégeage.

Nos récents comptages montrent des populations de pucerons très élevées dans les parcelles n'ayant reçu aucune protection à ce jour.

Des gelées sérieuses (-6 à -7°C) n'étant toujours pas annoncées, nos préconisations sont les suivantes :

* Dans les parcelles non protégées : **INTERVENEZ** dès réception du bulletin après constatation de présence notable de pucerons.

* Dans les autres situations : il n'y a généralement pas lieu d'intervenir. Visitez les parcelles traitées depuis plus de 3 semaines.

COLZA


Larves d'altise et de charançon du bourgeon terminal :

LARVE ALTISE



extrémités noires,
présence de pattes.

LARVE CHARANÇON



tête brunâtre, pas de
pattes.

Les infestations de cette année se rapprochent de celles que nous avons connues à l'automne 1982. Dans les parcelles n'ayant reçu aucune protection insecticide, les populations larvaires d'altise et de charançon sont souvent très importantes. Une surveillance de l'ensemble des cultures est nécessaire dans les tous prochains jours. Réalisez un comptage sur 25 à 50 pieds.

Préconisation :

* Intervenez si le seuil de 2 pieds sur 3 portant une larve d'altise ou de 10 à 20 % de pieds portant une larve de charançon est atteint.


* En cas de présence des 2 ravageurs : à même niveau de population, c'est le charançon qui est le plus dommageable car il détruit systématiquement le bourgeon terminal. En fonction des niveaux d'attaque, tenez compte en priorité du ravageur le plus dangereux.

* Si un traitement est nécessaire, réalisez-le d'ici la fin du mois avec des spécialités à base de parathion ou d'oléoparathion à 350 g de matière active/ha sur altise ou 400 g/ha sur charançon.

* Procédez à un nouveau contrôle dans 1 mois et peu de temps avant la reprise de végétation.

P.1.104

CYLINDROSPORIOSE



Des symptômes de cylindrosporiose (taches gris-vert, craquelées et entourées de points blancs) sont visibles en culture.

Des confusions sont toujours possibles avec d'autres champignons (phoma...). La détermination précise requiert l'aide d'un technicien averti.

Les essais mis en place les années passées ne permettent pas de juger l'intérêt d'une protection d'automne contre la cylindrosporiose. Les interventions pourront être réservées aux parcelles sérieusement touchées.

REPONDEUR AVERTISSEMENTS (26) 87.40.78